Otimização da Estrutura - Poda

Algoritmos destrutivos – Pruning ou Poda

Inspeção

Treinar a rede (sem saturar – paralizar)

Eliminar

Sinapses pequenas $|w| < w_{\min}$

Neurônios da camada intermediárias com pouca
variação na saída

$$\sigma(v) < \sigma_{\min}$$

Retreinar para “ajuste fino”

Retomar a eliminação

Pouco eficaz,

a rede “distribui as tarefas” entre os neurônios

Alterando a função objetivo

$$F = F_0 + \gamma F_1 \quad \gamma > 0$$

F_0 reduz o erro na saída F_1 reduz a estrutura da rede

Otimização de uma soma

$$\Delta \underline{w} \Rightarrow \Delta F = \Delta F_0 + \gamma \Delta F_1 < 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta F_0 < 0 & \Delta F_1 < 0 \\ \Delta F_0 < 0 & \Delta F_1 > 0 \\ \Delta F_0 > 0 & \Delta F_1 < 0 \end{cases}$$

Reduzindo sinapses

$$F = F_0 + \gamma F_1 = F_0 + \gamma \sum_{\forall i,j} w_{ij}^2$$

$$\frac{\partial F}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial F_0}{\partial w_{ij}} + 2\gamma w_{ij}$$

$$\Delta w_{ij} = -\alpha \frac{\partial F}{\partial w_{ij}} = -\alpha \frac{\partial F_0}{\partial w_{ij}} - 2\alpha\gamma w_{ij} = \Delta w_{ijBP} - 2\alpha\gamma w_{ij}$$

$$w_{ij\text{ novo}} = (1 - 2\alpha\gamma)w_{ij\text{ antigo}} + \Delta w_{ijBP} \quad 0 < \gamma \ll \frac{1}{2\alpha}$$

Obs: sem redução de sinapses $w_{ij\text{ novo}} = w_{ij\text{ antigo}} + \Delta w_{ijBP}$

quando $|w_{ij}| < \min \Rightarrow$ eliminar $w_{ij} \Rightarrow w_{ij} = 0$

Evolução geométrica do processo

Critério para γ

$$F = F_0 + \gamma F_1 \quad \left\{ \begin{array}{l} \gamma \ll 1 \quad \text{não reduz sinapses} \\ \gamma \gg 1 \quad \text{não minimiza } F_0 \end{array} \right.$$

Heurística para γ

$$|\underline{\Delta w}_{F_0}| \approx |\underline{\Delta w}_{\gamma F_1}| = 2\alpha\gamma|\underline{w}|$$

$$\gamma \approx \left\{ \begin{array}{l} \text{por valor médio} \quad \gamma \approx \frac{E(|\underline{\Delta w}_{F_0}|)}{2\alpha E(|\underline{w}|)} \\ \text{por sinapse} \quad \gamma_{ij} \approx \frac{|\Delta w_{ij}|}{2\alpha |w_{ij}|} \end{array} \right.$$

Reduzindo as menores sinapses

$$F = F_0 + \gamma F_1 = F_0 + \gamma \sum_{\forall i,j} \frac{w_{ij}^2}{a^2 + w_{ij}^2} = F_0 + \gamma \sum_{\forall i,j} \frac{1}{a^2 + w_{ij}^2} w_{ij}^2$$

$$|w_{ij}| \begin{cases} \ll a & F_1 \approx \frac{1}{a^2} w_{ij}^2 \\ \gg a & F_1 \approx 1 \end{cases}$$

heurística: $a \approx E(|w_{ij}|)$

$$F = F_0 + \gamma F_1 = F_0 + \gamma \sum_{\forall i,j} \frac{w_{ij}^2}{a^2 + w_{ij}^2} = F_0 + \gamma \sum_{\forall i,j} \frac{1}{a^2 + w_{ij}^2} w_{ij}^2$$

$$\frac{\partial F}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial F_0}{\partial w_{ij}} + 2\gamma \frac{a^2 w_{ij}}{(a^2 + w_{ij}^2)^2}$$

$$\Delta w_{ij} = -\alpha \frac{\partial F}{\partial w_{ij}} = -\alpha \frac{\partial F_0}{\partial w_{ij}} - 2\alpha\gamma \frac{a^2 w_{ij}}{(a^2 + w_{ij}^2)^2} = \Delta w_{ijBP} - 2\alpha\gamma \frac{a^2}{(a^2 + w_{ij}^2)^2} w_{ij}$$

$$w_{ijnovo} = \left(1 - 2\alpha\gamma \frac{a^2}{(a^2 + w_{ij}^2)^2}\right) w_{ijantigo} + \Delta w_{ijBP}$$

Obs: sem redução de sinapses

$$w_{ijnovo} = w_{ijantigo} + \Delta w_{ijBP}$$

quando $|w_{ij}| < \min \Rightarrow$ eliminar $w_{ij} \Rightarrow w_{ij} = 0$

Heurística para γ

$$E|\Delta w_{ijBP}| \approx E|\Delta w_{ij \gamma F}|$$

$$E|\Delta w_{ijBP}| \approx 2\alpha\gamma \frac{a^2}{(a^2 + \sum_i w_{ij}^2)^2} E|w_{ij}| = \frac{\alpha\gamma}{2a}$$

$$\gamma \approx \frac{2a}{\alpha} E|\Delta w_{ijBP}|$$

Eliminando neurônios da camada intermediária

$$F = F_0 + \gamma F_1 = F_0 + \gamma \sum_{\forall j} \frac{\sum_i w_{ij}^2}{a^2 + \sum_{\forall i} w_{ij}^2}$$

$\sum_{\forall j}$ somatório para todos os neurônios j da camada intermediária

$\sum_{\forall i} w_{ij}^2$ somatório para todas as sinapses do neurônio j da camada intermediária

heurística: $a \approx \left(E \left(\sum_{\forall i} w_{ij}^2 \right) \right)^{1/2}$

$$F = F_0 + \gamma F_1 = F_0 + \gamma \sum_{\forall j} \frac{\sum_{\forall i} w_{ij}^2}{a^2 + \sum_{\forall i} w_{ij}^2} \quad \frac{\partial F}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial F_0}{\partial w_{ij}} + 2\gamma \frac{a^2 w_{ij}}{\left(a^2 + \sum_{\forall i} w_{ij}^2\right)^2}$$

$$\Delta w_{ij} = -\alpha \frac{\partial F}{\partial w_{ij}} = \Delta w_{ijBP} - 2\alpha\gamma \frac{a^2}{\left(a^2 + \sum_{\forall i} w_{ij}^2\right)^2} w_{ij}$$

$$w_{ijnovo} = \left(1 - 2\alpha\gamma \frac{a^2}{\left(a^2 + \sum_{\forall i} w_{ij}^2\right)^2}\right) w_{ijantigo} + \Delta w_{ijBP}$$

Obs: sem redução de sinapses $w_{ijnovo} = w_{ijantigo} + \Delta w_{ijBP}$

quando $\left|\sum_{\forall i} w_{ij}^2\right| < \min \Rightarrow$ eliminar o neurônio j

Heurística para γ

$$E|\Delta w_{ijBP}| \approx E|\Delta w_{ij\gamma F}|$$

$$E|\Delta w_{ijBP}| \approx 2\alpha\gamma \frac{a^2}{\left(a^2 + \sum_{\forall i} w_{ij}^2\right)^2} E|w_{ij}| = \frac{\alpha\gamma}{2a}$$

$$\gamma \approx \frac{2a}{\alpha} E|\Delta w_{ijBP}|$$

Reduzindo entradas (alternativa à relevância)

Similar à eliminação de neurônios

$$F = F_0 + \gamma F_1 = F_0 + \gamma \sum_{\forall j} \frac{\sum_{\forall i} w_{ij}^2}{a^2 + \sum_{\forall i} w_{ij}^2}$$

$\sum_{\forall j}$ somatório para todas as entradas j

$\sum_{\forall i} w_{ij}^2$ somatório para todas as sinapses da entrada j

Poda e saturação para criação de regras lógicas

Íris

Setosa

Versicolor

Virginica

Entradas:	Saídas
largura da sépala	Íris setosa
comprimento da sépala	Íris versicolor
largura da pétala	Íris virginica
comprimento da pétala	

A rede inicial e a rede podada e saturada

rede inicial

rede podada e saturada

regras lógicas baseadas
diretamente nas sinapses:

1. Se $1,13 \text{ largura pétala} + 2,88 \text{ comprimento pétala} < 5,279$ → setosa
2. Se: $1,29 \text{ largura pétala} + 1,12 \text{ comprimento pétala} < 10,36$ → virgínica
3. Versicolor em outros casos.

regra lógica refeita (denormalizada e aproximada):

1. Se: $\text{largura da pétala} + \text{comprimento da pétala} < 5$ → setosa
2. Se: $\text{largura da pétala} + \text{comprimento da pétala} < 10$ → virgínica
3. Versicolor em outros casos.